

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP -4-5-71 180510

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 128 - MAI 1971

Ministère de l'Agriculture

STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS  
VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique  
de MONTPELLIER

Montpellier le 29 Avril 1971

NOTE : 2

## MILDIOU

Du mildiou a été découvert à Valros, Saint-Geniès-le-Bas, Montblanc, etc.... ; il est localisé au niveau des sarments publiés à la taille ou des repousses insérées sur le pied des souches ; il n'y en a pas lorsque ces organes ont été enlevés.

Des cas analogues doivent se rencontrer dans les sols humides placés à bonne exposition; ces emplacements ignorés sont très dangereux, car les germes aériens qu'ils renferment sont de nature à assurer des contaminations liées à la première pluie importante dont on ignore la date.

En conséquence :

a) continuer à supprimer toutes les repousses nées sur le pied de la souche;

b) dans les vignobles les plus avancés où les grappes sont bien détachées, effectuer un traitement et le renouveler (sous peu de temps), dès que la croissance aura fait disparaître les effets de la précédente application.

Le Directeur de la Station Régionale  
d'Avvertissements Viticoles :

G. BERNON

-----  
Erratum : Numéro 127 - 3° supplément en date du 21 avril :

Lire : DITHIANON et non Diethion

### TORDEUSE ORIENTALE

Le premier papillon a été observé dans notre élevage de Montpellier le 29 avril; des accouplements, puis des pontes, se produiront dans quelques jours.

Actuellement les écussons de greffe en pépinière et les pousses des jeunes arbres en cours de formation peuvent être gravement endommagés par les larves de Tordeuse orientale; sur ces arbres un traitement sera exécuté avant le 10 mai.

### MONILIA

Du fait des pluies la maladie poursuit son développement; sur cerisier, en particulier, elle est bien installée dans des vergers de vallée. En conséquence, des pulvérisations à base de Benomyl, Carbatène, Folpel, Mancozèbe, Thiabendazole, ou de Thirane, sont nécessaires contre Monilia laxa sur cerisier et prunier, contre Monilia fructigena sur pêcher et abricotier.

Dans les vergers atteints de Fusicoccum, utiliser le Thirane si le traitement intervient après l'éclaircissage.

L.L.TROUILLON

### TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Les conditions climatiques sont très favorables au développement des tavelures et, dans la majorité des cas, les traitements préventifs n'ont pu être effectués. Dans les zones de montagne la situation est souvent critique. Nous ne saurions trop insister sur le soin à apporter au prochain traitement et notamment dans le choix des fongicides.

M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 3 mai 1971 : 2680 exemplaires

Précédent bulletin 4° supplément du n° 127 du 26 avril 1971